

😊 各種ワクチンの接種スケジュール 😊

○ ロタウイルスワクチン


(1)ロタリックス（1価ワクチン）の場合

【接種年齢】生後6週～24週（約5か月半）

【接種間隔・回数】

27日以上の間隔をあけて2回経口投与

※標準的接種開始：生後2ヶ月から生後14週6日までに接種を開始




(2)ロタテック（5価ワクチン）の場合

【接種年齢】生後6週～32週（約7か月半）

【接種間隔・回数】

27日以上の間隔をあけて3回経口投与

※標準的接種開始：生後2ヶ月から生後14週6日までに接種を開始



○ ヒブ (Hib)

【接種年齢】生後2ヶ月以上5歳未満

【接種間隔・回数】

(1)初回接種の開始が生後2ヶ月以上7ヶ月未満の場合（合計4回）

初回はそれぞれ27日以上あけて3回

※標準的な接種間隔：27～56日

※2回目及び3回目は1歳未満までに終了させる

※2回目及び3回目が1歳を超えた場合は行わない（追加接種は可能）

追加は初回終了後7ヶ月以上あけて1回

※標準的な接種間隔：初回終了後7ヶ月以上13か月末満

※初回の2回目あるいは3回目が1歳未満までに終了せず、1歳以降に追加接種を行う場合は、初回の1回目あるいは2回目の

終了後27日以上あけて行う



(2)初回接種の開始が7ヶ月以上1歳未満の場合（合計3回）

初回は27日以上あけて2回

※標準的な接種間隔：27～56日


※2回目は1歳未満までに終了させる

※2回目が1歳を超えた場合は行わない（追加接種は可能）


追加は初回終了後7か月以上あけて1回

※標準的な接種間隔：初回終了後7か月以上13か月末満

※初回の2回目が1歳未満までに終了せず、1歳以降に追加接種を行う場合は、初回の1回目の終了後27日以上あけて行う



(3)初回接種の開始が1歳以上5歳未満の場合（合計1回）



○ 小児用肺炎球菌

【接種年齢】生後2か月以上5歳未満

【接種間隔・回数】

(1)初回接種の開始が生後2か月以上7か月末満の場合（合計4回）

初回はそれぞれ27日以上あけて3回


※2回目及び3回目は2歳未満までに終了させる

※2回目及び3回目が2歳を超えた場合は行わない（追加接種は可能）

※また、2回目が1歳を超えた場合、3回目は行わない（追加接種は可能）

追加は初回終了後60日以上あけて1歳以降に1回

※標準的には初回終了後60日以上あけて1歳以上1歳3か月末満に行う




(2)初回接種の開始が7か月以上1歳未満の場合（合計3回）


初回は27日以上あけて2回

※2回目は2歳未満までに終了させる

※2回目が2歳を超えた場合は行わない（追加接種は可能）


追加は初回終了後60日以上あけて1歳以降に1回






(3) 初回接種の開始が1歳以上2歳未満の場合（合計2回）

60日以上あけて2回



(4) 初回接種の開始が2歳以上5歳未満の場合（合計1回）




○ B型肝炎 ※平成28年4月1日以降に生まれた者が対象

【接種年齢】1歳未満

【接種間隔・回数】27日以上あけて2回，1回目から139日以上あけて1回追加

※母子感染予防でB型肝炎ワクチンの接種を受ける場合は、定期接種としてではなく、健康保険で受けます。



○ 4種混合・ポリオ

【接種年齢】生後3か月以上7歳6か月未満


【接種間隔・回数】1期初回はそれぞれ20日以上あけて3回

1期追加は1期初回の3回目終了後6か月以上あけて1回



○ BCG

【接種年齢】 1歳未満




○ MR (麻しん・風しん混合), 麻しん, 風しん

【接種年齢】 1期は1歳以上2歳未満

2期は5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間（年度内に6歳になる者）

【接種回数】 1期は1回 2期は1回



○ 水痘

【接種年齢】 1歳以上3歳未満

【接種間隔・回数】 3か月以上あけて2回



○ 日本脳炎


【接種年齢】 1期は生後6か月以上7歳6か月末満

2期は9歳以上13歳未満

【接種間隔・回数】 1期初回は6日以上あけて2回


1期追加は初回終了後6か月以上あけて1回

2期は1回



○ 2種混合

【接種年齢】 11歳以上13歳未満



【標準：11歳以上12歳未満】


○ 子宮頸がん予防（HPV）

【接種年齢】12歳になる年度初日から16歳になる年度末日までの女子（小学6年～高校1年相当）

【接種間隔・回数】

(1) サーバリックス（2価ワクチン）の場合

1か月以上あけて2回、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて1回



(2) ガーダシル（4価ワクチン）の場合

1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回

