

「フロンサイドSC」がほ場で散布 できるようになりました！



令和5年6月7日、基腐病に登録のある農薬「フロンサイドSC」が適用拡大され、植付後の散布が可能になりました。

使用時期	使用方法	希釈水量（希釈倍数）	使用回数	備考
植付前	全面散布土壌混和	50～200 L / 10 a (使用薬量：500mL)	いずれか 1回	適用 拡大
	全面土壌散布	50～200 L / 10 a (使用薬量：500mL)		
収穫30日前まで	散布	100～300 L / 10 a (希釈倍率：1,000倍)	2回以内	

薬剤の散布例

植付前（1回）		植付後（2回以内）		
		1回目	2回目	3回目
畝立て前 フrintフロアブル25 の全面散布土壌混和	植付前 ベンレート水和剤 による苗消毒	植付から21日後 フロンサイドSC (300L/10a)	1回目から14日後 フロンサイドSC (300L/10a)	2回目から30日後 トリフミン水和剤 (300L/10a)

ポイント

- I 植付後、茎葉が畝間を覆う前までにしっかり散布しましょう。
- II フロンサイドSCは、植付前の土壌処理剤としてフrintフロアブル25を使用したほ場でも使用できます。
- III 上記は散布の一例です。3回目以降は異なる薬剤でローテーション散布を行いましょう。

