

ロタウイルス

◆ロタリックス（1価ワクチン）

【接種年齢】 生後6週0日～24週（約5か月半）

【接種間隔・回数】 27日以上の間隔をおいて2回経口接種

◆ロタテック（5価ワクチン）

【接種年齢】 生後6週0日～32週（約7か月半）

【接種間隔・回数】 27日以上の間隔をおいて3回経口接種

※生後15週0日以降の1回目の接種は安全性が確立されていないので、1回目の接種は必ず生後14週6日までに受けてください。

※どちらか一方のワクチンを選択し、1回目のワクチンと同じワクチンで、2回目以降も接種します。

【標準的な接種スケジュール】

月齢（年齢）		0歳																	1歳																	2歳																	3歳																	4歳																	5歳																	6歳																	7歳																	8歳																	9歳																	10歳																	11歳																	12歳																	13歳																	14歳																	15歳																	16歳																	17歳																
		0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月	15か月	18か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳																																																																																																																																																																																																																																																																																			
予防接種の種類	種類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ロタウイルス ◆ロタリックス（1価）	経口接種	6週0日から 24週0日まで																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		① ②																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ロタウイルス ◆ロタテック（5価）	経口接種	6週0日から 32週0日まで																	※1回目の接種は、必ず生後14週6日まで受けてください。																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		① ② ③																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

※誕生日の翌日を生後1日後と数えます。

- ①生後6週0日…生まれてから6回目の生まれた日と同じ曜日
- ②生後14週6日…生まれてから15回目の生まれた日と同じ曜日の1日前
- ③生後24週0日…生まれてから24回目の生まれた日と同じ曜日
- ④生後32週0日…生まれてから32回目の生まれた日と同じ曜日

【3月1日に生まれた人の例↓】

- > ①4月12日 = 定期接種開始日
- > ②6月13日 = 初回接種の標準期間の終了日
- > ③8月16日 = ロリックス2回目接種期間の終了日
- > ④10月11日 = ロテック3回目接種期間の終了日

小児用肺炎球菌

【接種年齢】 生後2か月～5歳未満

【接種間隔・回数】 (接種を開始した時期により接種回数が異なります)

(1) 生後2か月～7か月未満で接種を開始した場合 (計4回接種)

初回接種：27日以上の間隔をおいて3回接種

※2・3回目は2歳未満までに行ってください。2歳を超えた場合は残りの接種は行わず、追加接種となります。また、2回目の接種が1歳を超えた場合は3回目の接種は行わず、追加接種となります。

追加接種：初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、1歳以降に1回接種

(2) 生後7か月～1歳未満で接種を開始した場合 (計3回接種)

初回接種：27日以上の間隔をおいて2回接種

※2回目は2歳未満までに行ってください。2歳を超えた場合は2回目の接種は行わず、追加接種となります。

追加接種：初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、1歳以降に1回接種

(3) 1歳～2歳未満で接種を開始した場合 (計2回接種)

60日以上の間隔をおいて2回接種

(4) 2歳～5歳未満で接種を開始した場合 (計1回接種)

1回接種

【標準的な接種スケジュール】

初回接種：生後2か月～7か月未満の間に接種を開始し、1歳未満までに、27日以上の間隔をおいて3回接種

追加接種：初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、1歳～1歳3か月未満の間に1回接種

① 定期接種の推奨期間 (標準の接種年齢/丸数字は何回目の接種かを表しています。)

無料で受けられる年齢 (法律で定められている接種対象年齢)

月齢 (年齢)		0歳											1歳																								
		0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月	15か月	18か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳					
予防接種の種類	種類																																				
	方法																																				
小児用肺炎球菌	不活化 筋肉内接種 皮下又は	2か月以上													5歳未満																						
		初回 ① ② ③												追加 ④																							
		2か月												1歳																							

B型肝炎

【接種年齢】 1歳未満

※HBs抗原陽性の妊婦から生まれたお子さまで、母子感染予防のためにB型肝炎ワクチンの接種を受けている場合は、定期予防接種の対象外となります。


【接種間隔・回数】 27日以上の間隔をおいて2回、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて（20週後の同じ曜日から接種可能）1回接種

【標準的な接種スケジュール】


1回目：生後2か月

2回目：生後3か月

3回目：生後7～8か月



定期接種の推奨期間
(標準の接種年齢/丸数字は何回目の接種かを表しています。)



無料で受けられる年齢
(法律で定められている接種対象年齢)

月齢(年齢)		0歳											1歳																					
		0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月	15か月	18か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
予防接種の種類	種類																																	
	方法																																	
B型肝炎	不活化	皮下接種	①											②		③																		
			2か月		9か月																													

5種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib）

【接種年齢】 生後2か月～7歳6か月未満

【接種間隔・回数】 1期初回：20日以上の間隔をおいて3回接種

1期追加：初回接種終了後、6か月以上の間隔をおいて1回接種

【標準的な接種スケジュール】

1期初回：生後2か月～7か月未満の間に接種を開始し、20日～56日の間隔をおいて3回接種

1期追加：初回接種終了後、6か月～1年6か月の間隔をおいて1回接種

① 定期接種の推奨期間
(標準の接種年齢/丸数字は何回目の接種かを表しています。)

無料で受けられる年齢
(法律で定められている接種対象年齢)

月齢（年齢）		0歳											1歳																					
		0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月	15か月	18か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
予防接種の種類	種類																																	
	方法																																	
5種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib)	不活化	筋肉内接種																																
		皮下又は																																
		2か月以上											7歳6か月未満																					
		初回														追加																		
		① ② ③														④																		
		2か月														1歳																		

H i b (ヒブ)

【接種年齢】 生後2か月～5歳未満

【接種間隔・回数】 (接種を開始した時期により接種回数が異なります)

(1) 生後2か月～7か月未満で接種を開始した場合 (計4回接種)

初回接種：27日以上の間隔をおいて3回接種

※2・3回目は1歳未満までに行ってください。1歳を超えた場合は残りの接種は行わず、追加接種となります。

追加接種：初回接種終了後、7か月以上の間隔をおいて、1回接種

(2) 生後7か月～1歳未満で接種を開始した場合 (計3回接種)

初回接種：27日以上の間隔をおいて2回接種

※2回目は1歳未満までに行ってください。1歳を超えた場合は2回目の接種は行わず、追加接種となります。

追加接種：初回接種終了後、7か月以上の間隔をおいて、1回接種

(3) 1歳～5歳未満で接種を開始した場合 (計1回接種)

1回接種

【標準的な接種スケジュール】

初回接種：生後2か月～7か月未満の間に接種を開始し、27日～56日の間隔をおいて3回接種

追加接種：初回接種終了後、7か月～13か月の間隔をおいて、1回接種

① 定期接種の推奨期間
(標準の接種年齢/丸数字は何回目の接種かを表しています。)

無料で受けられる年齢
(法律で定められている接種対象年齢)

月齢 (年齢)			0歳											1歳																					
			0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月	15か月	18か月	2歳	3歳																
予防接種の種類	種類	方法																																	
			H i b (ヒブ)	不活化	皮下接種	2か月以上														5歳未満															
初回 ①	②	③															追加 ④																		
			2か月												1歳																				

4種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）

【接種年齢】 生後2か月～7歳6か月未満

【接種間隔・回数】 1期初回：20日以上の間隔を以て3回接種

1期追加：初回接種終了後、6か月以上の間隔を以て1回接種

【標準的な接種スケジュール】

1期初回：生後2か月～1歳未満の間に接種を開始し、20日～56日の間隔を以て3回接種

1期追加：初回接種終了後、1年～1年6か月の間隔を以て1回接種

①

定期接種の推奨期間
(標準の接種年齢／丸数字は何回目の接種かを表しています。)

無料で受けられる年齢

(法律で定められている接種対象年齢)

月齢（年齢）		0歳											1歳																		
		0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月	15か月	18か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳
予防接種の種類	種類																														
	方法																														
4種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	種類	不活化																													
	方法	皮下接種																													
		2か月以上											7歳6か月未満																		
		初回 ①②③														追加 ④															
		2か月														1歳															

BCG（結核）

【接種年齢】 1歳未満

【接種回数・方法】 1回接種

※スタンプ方式で上腕の2か所に押しつけて接種します。接種したところは、直射日光を避け自然乾燥させてください。10分程度で乾きます。

【標準的な接種スケジュール】

生後5か月～8か月の間に1回接種

①

定期接種の推奨期間
(標準の接種年齢／丸数字は何回目の接種かを表しています。)

無料で受けられる年齢

(法律で定められている接種対象年齢)

月齢（年齢）		0歳											1歳																	
		0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月	15か月	18か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳
予防接種の種類	種類																													
	方法																													
BCG	種類	経皮接種																												
	方法	注射																												
													1歳未満																	
						①																								
						5か月			8か月																					

MR（麻しん風しん混合）

【接種年齢・回数】

1期：1歳～2歳未満に1回接種

2期：小学校就学前の1年間に1回接種

※2期接種のご案内は、接種時期になりましたら予診票を送付します。

① 定期接種の推奨期間
(標準の接種年齢/丸数字は何回目の接種かを表しています。)

無料で受けられる年齢
(法律で定められている接種対象年齢)

月齢（年齢）		0歳											1歳		2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳			
		0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月																	15か月	18か月	
予防接種の種類	種類																																
	方法																																
MR (麻しん風しん混合)	注射生												1歳以上		2歳未満		5歳以上7歳未満かつ小学校入学前の1年間 (幼稚園保育園等の年長)																
	皮下接種												①		②																		

水痘（水ぼうそう）

【接種年齢】 1歳～3歳未満

【接種間隔・回数】 3か月以上の間隔をおいて2回接種

【標準的な接種スケジュール】

1回目：1歳～1歳3か月未満の間に1回接種

2回目：1回目終了後、6か月～1年の間隔をおいて1回接種

① 定期接種の推奨期間
(標準の接種年齢/丸数字は何回目の接種かを表しています。)

無料で受けられる年齢
(法律で定められている接種対象年齢)

月齢（年齢）		0歳											1歳		2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
		0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月																	15か月	18か月
予防接種の種類	種類																															
	方法																															
水痘	注射生												1歳以上		3歳未満																	
	皮下接種												①		②																	

HPV（子宮頸がん予防）

【接種年齢】小学6年生～高校1年生相当の年齢の女子（標準：中学1年生）

※接種のご案内は、接種時期（中学校1年生）になりましたら予診票を送付します。

【接種間隔・回数】（ワクチンの種類によって接種間隔・回数が異なります）

◆サーバリックス（2価ワクチン）

1か月以上の間隔をおいて2回接種し、1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種

◆ガーダシル（4価ワクチン）

1か月以上の間隔をおいて2回接種し、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種

◆シルガード9（9価ワクチン）

① 1回目の接種を15歳未満で受ける場合

5か月以上の間隔をおいて2回接種


※2回目の接種を5か月未満の間隔で接種した場合は、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種

② 1回目の接種を15歳以上で受ける場合

1か月以上の間隔をおいて2回接種し、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種



定期接種の推奨期間
(標準の接種年齢/丸数字は何回目の接種かを表しています。)



無料で受けられる年齢
(法律で定められている接種対象年齢)

月齢（年齢）			0歳												1歳												2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳													
			0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月	15か月	18か月																																						
予防接種の種類	種類	方法																																																					
			HPV（子宮頸がん予防） ◆サーバリックス（2価） ◆ガーダシル（4価）	不活化	筋肉内接種																																									小学6年生から		高校1年生相当							
																								①② ③				中学1年生相当の女子																											
HPV（子宮頸がん予防） ◆シルガード9（9価）	不活化	筋肉内接種																																									小学6年生から		高校1年生相当										
																								①②				中学1年生相当の女子																											