

# サツマイモ基腐病対策



今やるべき！

## 排水対策・予防防除

基腐病は水を介してまん延するため、特に排水対策は重要です。



ここがポイント

ほ場に溜まった水が、  
ほ場の外へ流れるよう  
に、額縁明きよと排水  
路をつなげましょう。



排水路の土砂を除去



やってみよう！



重要！

異なる薬剤を組み合わせることで予防散布をしましょう！

### 薬剤の散布例

| 区分 | 植付前                      | 植付後                                    |                                      |                                         |
|----|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                          | 1回目                                    | 2回目                                  | 3回目                                     |
| 1例 | フリントフロアブル25<br>の全面散布土壌混和 | 植付から21日後<br>フロンサイドS C<br>(300L/10a)    | 1回目から14日後<br>フロンサイドS C<br>(300L/10a) | 2回目から30日後<br>トリフミン水和剤<br>(300L/10a)     |
| 2例 | —                        | 植付から21日後<br>フロンサイドS C<br>(300L/10a)    | 1回目から14日後<br>フロンサイドS C<br>(300L/10a) | 2回目から30日後<br>アミスター20フロアブル<br>(300L/10a) |
| 3例 | —                        | 植付から35日後<br>アミスター20フロアブル<br>(100L/10a) | 1回目から14日後<br>銅剤<br>(200L/10a)        | 2回目から14日後<br>アミスター20フロアブル<br>(300L/10a) |

大雨や台風の前には、殺菌剤で基腐病を予防しましょう。

